

登録日 2020/10/27

レジメン名 Gas029

腫瘍名 胃がん

申請医師 消化器外科

### 投与スケジュール

Tmab-Deruxtecan			21日毎 × PDまで	
			1コース	2コース
			1 8 15	22 ... (Day)
①	デキサート パロセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	5%ブドウ糖液 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓
③	エンハーツ 注射用水 5%ブドウ糖液	6.4 mg/kg 20 mL 100 mL	点滴 30分	↓
<b>初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能</b>				
④	5%ブドウ糖液 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓

### 注意事項

<b>【使用上の注意】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>原則、3次治療以降</li><li>病理結果にてHER2蛋白陽性者に限る。</li><li>初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。</li><li>投与の際には、心エコーによる心機能を確認する。LVEFの基準は適正使用ガイドを参照。モニタリングの頻度は、通常の患者では12週毎を目安に行う(臨床試験情報)。</li><li>心電図、トロポニンの測定は、患者に応じて適宜実施とする。</li><li>投与の際には、胸部X線及び胸部CT検査、SpO2検査、KL-6測定を行い、適宜フォローする。</li><li>0.2 μmインラインフィルターを使用する。</li><li>血管外漏出リスク: 炎症性</li><li>投与中および最終投与後一定期間は適切な避妊を行うこと 一定期間は、女性7ヵ月、男性4ヵ月が目安(適正使用ガイド引用)</li></ul>
<b>【減量・中止基準】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>適正使用ガイドを参照。</li></ul>
<b>【減量の目安】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1段階減量: 5.4mg/kg、2段階減量: 4.4mg/kg、3段階減量: 投与中止</li></ul>

### 参考文献

1) <i>N Engl J Med</i> , 382, 2419-2430 (2020).
2) エンハーツ添付文書
3) エンハーツ適正使用ガイド