

登録日 2021/12/20

登録番号 Gas033

腫瘍名 胃がん

申請医師 消化器外科

### 投与スケジュール

XELOX+Nivolumab				21日毎 × PDまで	
				1コース	2コース
				1	22
				8	15
				... (day)	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	オブジーボ 生理食塩水	360 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
④	デキサート パロノセトロン 5%ブドウ糖	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴 120分	↓	↓
⑥	5%ブドウ糖 (オキサリプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑦	ゼローダ	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	経口 朝、夕	Day 1~14	Day22 ~

### 注意事項

【適応】 原則、1次治療
【投与延期、中止基準】 適正使用ガイド参照
【調製上及び使用上の注意】
・オブジーボはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

### 参考文献

1) Annals of Oncology, 30, 250-258 (2019).
2) 最適使用推進ガイドライン ニボルマブ～胃癌～ 令和3年11月改訂版
3) 添付文書 (オブジーボ2021年11月改訂版、オキサリプラチン2020年1月改訂版、ゼローダ2020年11月改訂版)