

登録日 2026/5/26

登録番号 HER001

腫瘍名 HER2陽性の固形がん

申請医師 腫瘍内科

投与スケジュール

Tmab-Deruxtecan			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	デキササート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	5%ブドウ糖液 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 全開投与可	↓
③	エンハーツ 注射用水 5%ブドウ糖液	5.4 mg/kg 20 mL 100 mL	点滴 30分	↓
			初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能	
④	5%ブドウ糖液 (エンハーツ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 全開投与可	↓

注意事項

【適応】
①HER2陽性の標準的治療に不応、不耐の進行・再発の固形がん
②HER2陽性の標準的治療が存在しない進行・再発の固形がん

【使用上の注意】
・HER2遺伝子増幅の患者に使用
・初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
・心機能を確認する(適正使用ガイド参照)。
当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。
・投与の際には、胸部X線及び胸部CT検査、SpO2検査、KL-6測定を行い、適宜フォローする。
・0.2µmインラインフィルターを使用する。

【減量・中止基準】
・適正使用ガイドを参照。

【減量の目安】
・1段階減量: 4.4mg/kg、2段階減量: 3.2mg/kg、3段階減量: 投与中止

参考文献

1) J Clin Oncol, 42, 3817-3825 (2024).
2) J Clin Oncol, 42, 47-58 (2023)
2) エンハーツ添付文書2026年3月改訂版