

登録日 2020/12/22

登録番号 Nsci037

腫瘍名 非小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

Nivolumab+Ipilimumab

42日毎 × PDまたは 原則、最長24カ月間

			1コース		2コース		
			1	22	43	...	(day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓		
②	オプジーボ 生理食塩水	360 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓	↓		
③	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 30分	↓		↓		
④	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分 (全開)		↓			
⑤	ヤーボイ 生理食塩水	1 mg/kg 点滴 30分 20 mL	↓		↓		
⑥	生理食塩水 (ヤーボイ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓		↓		

注意事項

【適応】

・切除不能な非小細胞肺がん(1次治療)

【投与延期、中止基準】

・適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

・オプジーボはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)

・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。

・ヤーボイはインラインフィルターを使用(0.2~1.2 μm)

同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。

・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。

生食50mLのボトルから30mL抜いて調製する。

・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。

・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

1) New Engl J Med, 381, 2020-2031 (2019).

2) オプジーボ点滴静注 添付文書 2020年11月改訂版

3) ヤーボイ点滴静注 添付文書 2020年11月改訂版