

カルボプラチン+アブラキサン+テセントリク

を受けられる患者さまへ

・抗がん剤は、増え続けるがん細胞を攻撃する作用があります。がん細胞と同時に正常な細胞にも影響を与え、それらが副作用として現れます。副作用は必ず起こるわけではなく、その程度には個人差があります。個々に適切な処置を行い対応します。多くの副作用は治療終了後には回復しますので、正しい知識を身につけ、治療を受けましょう。

[投与スケジュール]

- ・3週間を1コースとして行います。点滴時間は約4時間です。
- ・4～6コースまで投与を継続し、5～7コース目からテセントリクのみ投与を継続します。
- ・テセントリクは初回60分で投与し、副作用がなければ2回目の投与時間は30分に短縮されます。

薬品名	薬の効能	治療スケジュール			
		1日目	8日目	15日目	16～21日目
デキサート アロキシ	吐き気止め	15分 			休
デキサート	吐き気止め		30分 	30分 	
テセントリク	抗がん剤	30～60分 			
アブラキサン	抗がん剤	30分 	30分 	30分 	
カルボプラチン	抗がん剤	60分 			

[副作用について]

骨髄抑制：白血球減少・ヘモグロビン減少（貧血）・血小板減少

・骨髄抑制は白血球やヘモグロビン、血小板などが減少する状態です。白血球が下がると細菌感染が起こりやすくなります。ヘモグロビン減少による貧血症状、血小板減少により血がとまりにくい症状も現れることがあります。抗がん剤を投与してから7～14日目くらいで最も減少すると考えられています。一般的には約2～4週間で回復してきますが、減少する程度によって治療を休むことや投与量を減量することがあります。また、放射線を受けている方は、骨髄抑制が強くなる場合があります。

【対策】**フィルグラステム、ノイトロジン**の投与(好中球を上げる薬)

【注意事項】

- ① **外出時はマスクの着用**を心がけ、**人ごみは避け**ましょう！
- ② 外出から戻った時は、**手洗い・うがい**をしましょう！
- ③ 体調が悪くなければ入浴はできます。きれいな浴室に入り、体を清潔にしましょう！
- ④ 歯磨きは口の中を傷つけないように、柔らかい清潔な歯ブラシでやさしく磨きましょう！
- ⑤ ひげそりは電気カミソリを使用するほうが望ましいです。
- ⑥ 貧血時は急激な動きを避け、十分な休養をとって無理をしないようにしましょう。めまいなどの症状があれば安静にして、動くときはゆっくり動きましょう。

悪心・嘔吐、食欲不振

・悪心、嘔吐は抗がん剤による胃や腸の粘膜障害および運動障害などで起こると考えられています。吐気、嘔吐および食欲の低下をおこします。症状の程度や持続時間には個人差があり、投与当日に症状がでることもあれば、5日間ほど続くものもあります。

【対策】①吐き気止めによる予防・治療

- ②食事制限がない場合、**好きなもの**を少しずつ食べてください。
香りの強いものや脂肪の多い食品は避けた方が良いでしょう。
- ③水分をきちんととるようにしましょう！

末梢神経障害

・アブラキサンの影響にてしびれ、痛み、感覚が鈍いなどの症状が見られます。治療開始 3～5 日後にでてくる場合があります。ひどくならないように下記の対策や休薬などで対処します。

【対策】ビタミン B₁₂ 製剤、牛車腎気丸、鎮痛剤

脱毛

・抗がん剤によって頭皮の毛根細胞が障害を受け、毛が抜けやすくなります。髪以外の部分でも起こります(体毛、眉毛、陰毛)。治療が終了すれば 3～6 ヶ月後には再び髪が生えてきます。

【対策】ウィッグ(鬘)、帽子

筋肉、関節の痛み

・肩や背中、腰、腕などの筋肉や関節に痛みが現れることがあります。症状は一時的ですが、つらいと感じる時は我慢せずにご相談ください。

倦怠感

・倦怠感は全身がだるくなったり、力が抜けた感じになります。

便秘

・便秘をおこすことがあります。便通を良くするためにも積極的に水分を摂取しましょう。排便回数、便の性状にあわせて下剤を使用します。

間質性肺炎

・この肺炎は酸素を取り込む肺胞(小さな組織が多数集まったブドウの房のような形)の壁(肺胞と肺胞の間)に炎症を起こします。症状は空咳(痰の出ない咳)、発熱、息切れ、呼吸困難などがあります。ただのかぜと見過ごすことがありますので、自分で判断せず、医療機関を受診しましょう。

免疫関連の有害事象

・テセントリクによって免疫関連の有害事象が起こることがあります。

多様な有害事象のため、別途、配布する製薬企業作成の説明書を確認して下さい。

- * その他、気になる症状があらわれた際や不安な時は、必ず医師、薬剤師または看護師に遠慮なく声をかけてください。
- * **休日、夜間に調子が悪くなった場合は、救急センターに受診することをお勧めします。その時は、事前に病院に連絡をしてください。**



済生会横浜市東部病院 化学療法委員会

☎ 045-576-3000

図：副作用の発現時期

