登録日	2026/4/28
腫瘍名	非小細胞肺がん

登録番号	Nscl059
申請医師	呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PTX+Cemiplimab　　21日毎　×　4コース

1コース（1〜22）　2コース（22〜）

①	生理食塩水（プライミング用）	50 mL	点滴	5分
②	リブタヨ	350 mg	点滴	30分
	生理食塩水	100 mL		
③	生理食塩水（リブタヨ用フラッシュ）	50 mL	点滴	5分（全開）
④	デキサート	19.8 mg	点滴	15分
	パロノセトロン	0.75 mg		
	ポララミン	5 mg		
	ファモチジン	20 mg		
	生理食塩水	50 mL		
⑤	パクリタキセル	200 mg/㎡	点滴	180分
	5%ブドウ糖	500 mL		
⑥	カルボプラチン	AUC　5 or 6	点滴	60分
	5%ブドウ糖	250 mL		
⑦	生理食塩水（カルボプラチン用フラッシュ）	50 mL	点滴	5分（全開）

維持療法　Cemiplimab　　21日毎　×　PD

5コース（1〜22）　6コース（22〜）　（day）

①	生理食塩水（プライミング用）	50 mL	点滴	5分
②	リブタヨ	350 mg	点滴	30分
	生理食塩水	100 mL		
③	生理食塩水（リブタヨ用フラッシュ）	50 mL	点滴	5分（全開）

注意事項

【適応】 切除不能な非小細胞肺がん(非扁平上皮がん, 扁平上皮がんの組織は問わない)
【投与延期、中止基準】適正使用ガイド参照
【調製上及び使用上の注意】
・パクリタキセルはインラインフィルターを使用(0.2または0.22μm)
・リブタヨは減量基準がないため、投与量は350mgの固定用量による投与
・リブタヨはインラインフィルターを使用(0.2〜5μm)。
　同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
・CBDCA量(mg)＝AUC X (GFR + 25)　GFRはCLcrで近似する。

参考文献

1) Nat Med, 28, 2374-2380 (2022).
2) 添付文書(リブタヨ2026年2月改訂版, ペメトレキセド2025年6月改訂版, カルボプラチン2026年1月改訂版)