

登録日 2009/11/24

登録番号 Ova010

腫瘍名 卵巣がん

申請医師 産婦人科

投与スケジュール

Dose dense PTX+CBDCA			21日毎×PD					
			1コース		2コース			
			1	8	15	22	...	
			(day)					
①	デキサート	9.9 mg	点滴	15分	↓			↓
	ポララミン	5 mg						
	ファモチジン	20 mg						
	パロノセトロン	0.75 mg						
	生理食塩水	50 mL						
①'	デキサート	6.6 mg	点滴	15分	↓	↓		
	ポララミン	5 mg						
	ファモチジン	20 mg						
	生理食塩水	50 mL						
②	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴	60分	↓	↓	↓	↓
	5%ブドウ糖	250 mL						
③	カルボプラチン	AUC 5~6	点滴	120分	↓			↓
	5%ブドウ糖	500 mL						
④	5%ブドウ糖	50 mL	点滴	5分	↓	↓	↓	↓
	(フラッシュ用)			(全開)				

注意事項

【注意事項】

- ・Calvertの式: CBDCA量 (mg) = AUC × (GFR + 25)
- ・JMSニトログリセリン用点滴ライン、0.22 μmのメンブランフィルターを使用すること。

【投与基準】臨床試験から引用した参考値

- ・各コース開始時: 好中球 > 1000/μL、血小板 > 7.5万/μL
- ・Day8、15投与時: 好中球 > 500/μL、血小板 > 5万/μL
- ・治療延期は最大3週間まで

【減量基準】臨床試験から引用した参考値

- ・血液毒性出現時
(FN発症、Grade4好中球減少、血小板1万/μL未満、血小板1~5万/μLで出血傾向あり、血液毒性で1週間以上治療延期する場合):
カルボプラチン減量 AUC6⇒AUC5⇒AUC4
- ・非血液毒性出現時(Grade2以上の末梢神経障害発現時):
パクリタキセル減量 80mg/m²⇒70mg/m²⇒60mg/m²

参考文献

1) Katsumata N, et al, Dose-dense paclitaxel once a week in combination with carboplatin every 3 weeks for advanced ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomised controlled trial, Lancet, 374, 1331-1338 (2009).