

登録日 2013/12/24

登録番号 Ova015

腫瘍名 卵巣がん

申請診療科 産婦人科

投与スケジュール

PTX+CBDCA+Bmab				21日毎 × 6コース(Max)		
				1コース	2コース	...
				1	22	(day)
①	デキサート ポラミン ファモチジン パロノセトロン 生理食塩水	19.8 mg 5 mg 20 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	
②	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	175 mg/m ² 250 mL	点滴 120分	↓	↓	
③	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5~6 250 mL	点滴 60分	↓	↓	
④	5%ブドウ糖液 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	
⑤	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	
⑥	ベバシズマブBS 生理食塩水	15 mg/kg 100 mL	点滴 30分	↓	↓	
⑦	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	

注意事項

対象: 進行卵巣がん(stage III~IV)

$CBDCA量(mg) = AUC \times (GFR + 25)$

GFRはCL_{cr}で近似する。

1コース目の開始が手術日より28日以上経過していればbevacizumab投与可

6コース以降は⑤のみ (bevacizumab維持療法へ)

⑥は初回90分、副作用がなければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可

参考文献

Incorporation of Bevacizumab in the Primary Treatment of Ovarian Cancer:
N Engl J Med 2011;365:2473-83