


登録日 2017/6/27

登録番号 Renal002

腫瘍名 腎細胞がん

申請医師 泌尿器科

### 投与スケジュール



### 注意事項

・適応: 切除不能な進行・再発の腎細胞がん(2次治療以降)

#### 【調製上及び使用上の注意】

- ・希釈後の最終濃度は0.35mg/mL以上が必要 (総液量は60mL以上が必要)  
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- ・インラインフィルターを使用(0.2または0.22  $\mu$  m)  
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、  
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

### 参考文献

- 1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2018年8月改訂版
- 2) オプジーボ適正使用ガイド 2016年1月作成
- 3) R.J. Motzer, et al, Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma, N Engl J Med, 373, 1803-1813 (2015).