

登録日 2017/11/29
2018/10/23(術後療法)

登録番号 Mela003

腫瘍名 悪性黒色腫

申請医師 皮膚科

投与スケジュール

Nivolumab			14日毎	×PDまで (術後補助療法では12カ月間まで)
			1	15 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	オプジーボ 生理食塩水	240 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

注意事項

【適応】

- ・根治切除不能な悪性黒色腫(1次、2次治療)
 - * Nivolumab+Ipilimumab療法を4コース実施後に使用することがある。
- ・根治切除可能な悪性黒色腫(術後)

【投与延期、中止基準】

- ・適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

- ・調製時は静かに転倒混和する。
- ・インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2018年8月改訂版
- 2) Jeffrey SW, et al, Lancet oncol, 17, 943-955 (2017).
- 3) J. Weber, et al, N Engl J Med, 377, 1824-1835 (2017).