

登録日 2020/12/22
2020/12/22(術後療法)

登録番号 Mela003

腫瘍名 悪性黒色腫

申請医師 皮膚科

投与スケジュール

Nivolumab			28日毎 × PDまで (術後補助療法では12カ月間まで)	
			1コース	2コース
			1	29 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	オプジーボ 生理食塩水	480 mg 点滴 30分 76 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

注意事項

<p>【適応】</p> <ul style="list-style-type: none">根治切除不能な悪性黒色腫(1次、2次治療)<ul style="list-style-type: none">* Nivolumab+Ipilimumab療法を4コース実施後に使用することがある。根治切除可能な悪性黒色腫(術後) <p>【投与延期、中止基準】</p> <ul style="list-style-type: none">適正使用ガイド参照 <p>【調製上及び使用上の注意】</p> <ul style="list-style-type: none">調製時は静かに転倒混和する。インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm) 同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。 振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。血管外漏出リスクは非炎症性に相当。免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。
--

参考文献

<p>1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2020年11月改訂版 2) Jeffrey SW, et al, Lancet oncol, 17, 943-955 (2017). 3) J. Weber, et al, N Engl J Med, 377, 1824-1835 (2017).</p>
