

登録日 2020/12/22

登録番号 Mela006

腫瘍名 悪性黒色腫

申請医師 皮膚科

投与スケジュール

| Nivolumab維持療法時 | | | 28日毎 PDまで | |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|
| | | | 1コース | 2コース |
| | | | 1 | 29 ... (day) |
| ① | 生理食塩水 (プライミング用) | 50 mL 点滴 5分 | ↓ | ↓ |
| ② | オプジーボ 生理食塩水 | 480 mg 点滴 30分 76 mL | ↓ | ↓ |
| ③ | 生理食塩水 (フラッシュ用) | 50 mL 点滴 5分 | ↓ | ↓ |

注意事項

【適応】

- ・根治切除不能な悪性黒色腫(1次治療)。**前治療歴がないこと。**
- ・PDL1測定必須。
* PDL1>1%の事例では、本レジメンに対してNivolumab単剤の効果が劣っていない。

【投与延期、中止基準】

- ・適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

- ・本治療は**4コース実施後、Nivolumab単剤治療(維持療法)へ移行する。**
- ・調製時は静かに転倒混和する。
- ・オプジーボはインラインフィルターを使用(**0.2または0.22 μm**)
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・ヤーボイはインラインフィルターを使用(**0.2~1.2 μm**)
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) New Engl J Med, 377, 1345-1356 (2017).
- 2) オプジーボ点滴静注 添付文書 2020年11月改訂版