

登録日 2018/10/1

レジメン名 Uro012

腫瘍名 尿路上皮がん(個人限定)

申請医師 泌尿器科

投与スケジュール

DD MVAC			14日毎 × PDまで	
			1コース	2コース
			1 2 3 4 5 6	15 ... (day)
①	フィジオ140	500 mL 点滴 60分	↓	
②	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL 点滴 60分	↓	
③	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL 点滴 15分	↓	
④	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL 点滴 15分	↓	↓
⑤	メソトレキセート 生理食塩水	30 mg/m ² 100 mL 点滴 60分	↓	↓
⑥	エクザール 生理食塩水	3 mg/m ² 50 mL 点滴 全開	↓	
⑦	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑧	アドリアシン 5%ブドウ糖液	30 mg/m ² 50 mL 点滴 全開	↓	
⑨	20%マンニトール	300 mL 点滴 60分	↓	
⑩	シスプラチン 生理食塩水	70 mg/m ² 500 mL 点滴 120分	↓	
⑪	フィジオ140	500 mL 点滴 2時間	↓	
⑫	フィジオ140 (Day3の10時までキープ)	1000 mL 点滴 16時間	↓	
⑬	フィジオ デキサート (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 6.6 mg 点滴 24時間	↓↓↓	
⑭	フィジオ (1日4本の輸液を24時間でキープして投与)	2000 mL 点滴 24時間		↓

注意事項

- ・Day2～5間は尿量1日3L以上を確保し、2～3L以下はマンニトール、ラシックスを併用する。
- ・Day2～3までのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day2のフィジオの2時間投与後に翌日までキープして投与します)
- ・Day4～10にG-CSFを皮下注する。

参考文献

1) J Clin Oncol, 19, 2638-2646 (2001).
2) NCCN Guideline 2017年第2版