

登録日	2025/3/25
腫瘍名	尿路上皮がん

登録番号	Uro020
申請医師	泌尿器科

投与スケジュール

GEM+CBDCA+Nivolumab				21日毎 × 6コース	
				1コース	2コース
				1 8	22 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓
② オブジーボ	360 mg	点滴 30分	↓		↓
生理食塩水	100 mL		↓		↓
③ 生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 30分	↓		↓
④ デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓		↓
パロノセトロン	0.75 mg		↓		↓
生理食塩水	50 mL		↓		↓
⑤ デキサート	6.6 mg	点滴 15分		↓	
生理食塩水	50 mL			↓	
⑥ ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴 30分	↓ ↓		↓
生理食塩水	100 mL				↓
⑦ カルボプラチン	AUC 5	点滴 60分	↓		↓
5%ブドウ糖	250 mL		↓		↓
⑧ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓ ↓		↓
Nivolumab 維持療法				28日毎 × PDまたは初回投与から2年間	
				7コース	8コース
				1	29 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓
② オブジーボ	480 mg	点滴 30分	↓		↓
生理食塩水	76 mL		↓		↓
③ 生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓		↓

注意事項

・腎機能低下事例などシスプラチンが不適応と考えられる事例に用いる。 ・カルボプラチン用量＝目標AUC × (GFR+25) (カルバートの式を使用) ・オブジーボはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm) ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。 ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

1) N Engl J Med, 389, 1778–1789 (2023).
2) 添付文書(オブジーボ2024年12月改訂版、ゲムシタビン2024年12月改訂版、カルボプラチン2025年1月改訂版)