

登録日	2026/5/26
腫瘍名	肛門がん

登録番号	Ana005
申請医師	消化器外科

### 投与スケジュール

CBDCA+PTX+Retifanlimab			28日毎 × PDまたは忍容不能まで			
			1コース			2コース
			1	8	15	29 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓			↓
②	ジニイズ 生理食塩水	500 mg 100 mL 点滴 30分	↓			↓
③	生理食塩水 (ジニイズ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分 (全開)	↓			↓
④	デキサート ポラミン ファモチジン パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 5 mg 20 mg 0.75 mg 50 mL 点滴 15分	↓			↓
⑤	デキサート ポラミン ファモチジン 生理食塩水	6.6 mg 5 mg 20 mg 50 mL 点滴 15分		↓	↓	
⑥	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80 mg/m <sup>2</sup> 250 mL 点滴 1時間	↓	↓	↓	↓
⑦	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 5 250 mL 点滴 1時間	↓			↓
⑧	5%ブドウ糖 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分 (全開)	↓	↓	↓	↓

### 注意事項

#### 【適応】

・進行、再発の肛門癌

#### 【臨床試験の投与コース数に関する情報】

・臨床試験では、パクリタキセル、カルボプラチン、ジニイズの併用療法を6コース実施後、ジニイズ単剤療法を7コース実施する規定であった。

#### 【調製上及び使用上の注意】

- ・本療法は進行肛門癌を対象とし、国内での承認薬に限られることを踏まえ、実臨床では投与コース数を一律に規定しない。患者の全身状態、有害事象、治療効果を評価し、各薬剤の減量および休薬を、適宜、検討すること。
- ・ジニイズはインラインフィルターを使用(0.2~5 μm)。
- ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
- ・パクリタキセルはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCL<sub>cr</sub>で近似する。

### 参考文献

- 1) Lancet Oncol+A1:F33 405, 2144-2152 (2025).
- 2) 添付文書(ジニイズ2026年3月改訂版、パクリタキセル2025年12月改訂版、カルボプラチン2026年1月改訂版)