

登録日 2023/7/25

登録番号 Eso014

腫瘍名 食道がん

申請科 消化器外科

投与スケジュール

FP+Nivolumab(4週毎)			28日毎 PDまで										
			1コース							2コース			(day)
			1	2	3	4	5	6	7	29	...		
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓								↓	
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓								↓	
③	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓								↓	
④	オブジーボ 生理食塩水	480 mg 76 mL	点滴 30分	↓								↓	
⑤	生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓								↓	
⑥	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓								↓	
⑦	シスプラチン 生理食塩水	80 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓								↓	
⑧	フルオロウラシル 生理食塩水	800 mg/m ² 500 mL	点滴 24時間	↓	↓	↓	↓	↓				↓	
⑨	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓								↓	
⑩	フィジオ140 <small>(Day2の10時までキープして投与)</small>	1000 mL	点滴 16時間	↓								↓	
⑪	フィジオ140 デキサート プリンペラン	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間		↓	↓	↓						
	<small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small>												
⑫	フィジオ140 プリンペラン	2000 mL 20 mg	点滴 24時間					↓	↓				
	<small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small>												

注意事項

- ・適応
化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発食道がん(扁平上皮癌、腺扁平上皮癌含む):一次治療
- ・Day1~2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- ・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
- ・体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call
- ・オブジーボは、インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μ m)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照

参考文献

1) N Engl J Med, 386, 449-462 (2022).
2) 添付文書(オブジーボ2023年6月改訂版、シスプラチン2022年3月改訂版、フルオロウラシル2023年7月改訂版)