

登録日 2023/6/27

登録番号 Hepa004

腫瘍名 肝細胞がん

申請医師 消化器内科

投与スケジュール

Durvalumab+Tremelimumab				28日毎 PDまで	
				1コース	
				1	29 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	イジユド 生理食塩水	300 mg 100 mL	点滴 60分	↓	
				(体重30kg以下の場合、イジユド投与量は4mg/kg)	
③	生理食塩水 (イジユド用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	
④	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓	↓
				(体重30kg以下の場合、イミフィンジ投与量は20mg/kg)	
⑤	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
				2コース	
				1	29 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓	↓
③	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓

注意事項

【適応】 切除不能な肝細胞がん(原則、Child-Pugh Aおよび1次治療が対象)

【投与延期、中止基準】 適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

- ・イジユドは、体重30kg以下の場合の1回投与量は4mg/kgとする。
- ・イミフィンジは、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
- ・イミフィンジおよびイジユドは **インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)**
- ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) イジユド添付文書 2022年12月版、イミフィンジ添付文書2022年12月改訂版
- 2) NEJM Evid, 2022; 1(8).