

登録日 2023/3/28

登録番号 Nsc1044

腫瘍名 非小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab 21日毎 × 4コース  
(5コース目から、維持療法に移行し、PDまで継続)

				1コース		2コース	
				1		22	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓	
②	イジユド 生理食塩水	75 mg 100 mL	点滴 60分	↓		↓	
③	生理食塩水 (イジユド用フラッシュ)	100 mL	点滴 60分	↓		↓	
				<b>(2コース目以降、投与時間を5分に短縮可)</b>			
④	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓		↓	
				<b>(体重30kg以下の場合、イミフィンジ投与量は20mg/kg)</b>			
⑤	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	100 mL	点滴 60分	↓		↓	
				<b>(2コース目以降、投与時間を30分に短縮可)</b>			
⑥	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓		↓	
⑦	ペメトレキセド 生理食塩水	500 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴 10分	↓		↓	
⑧	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 5 or 6 250 mL	点滴 60分	↓		↓	
⑨	生理食塩水 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓		↓	

維持療法

				5コース		6コース		7コース	
				1		29		57	(day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓		↓	
②	イジユド 生理食塩水	75 mg 100 mL	点滴 60分	↓		↓		↓	
③	生理食塩水 (イジユド用フラッシュ)	100 mL	点滴 60分	↓		↓		↓	
				<b>(2コース目以降、投与時間を5分に短縮可)</b>					
④	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓		↓		↓	
				<b>(体重30kg以下の場合、イミフィンジ投与量は20mg/kg)</b>					
⑤	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	100 mL	点滴 30分	↓		↓		↓	
⑥	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓		↓		↓	
⑦	ペメトレキセド 生理食塩水	500 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴 10分	↓		↓		↓	
⑧	生理食塩水 (ペメトレキセド用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓		↓		↓	

注意事項

【適応】 切除不能な非小細胞非扁平上皮肺がん(原則、1次治療)  
 【投与延期、中止基準】 適正使用ガイド参照  
 【調製上及び使用上の注意】  
 ・イミフィンジは、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。  
 ・イミフィンジおよびイジユドはインラインフィルターを使用(0.2または0.22μm)  
 ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。  
 ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。  
 ・ペメトレキセド開始7日以上前から葉酸0.5mgを連日経口投与する。レジメンを中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。  
 ・少なくともペメトレキセド開始7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。  
 ・治療期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。  
 ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。

参考文献

- 1) J Clin Oncol, 41, 1213-1227 (2023).
- 2) 各添付文書  
(イミフィンジ2022年12月改訂版, イジユド2022年12月改訂版, ペメトレキセド2021年6月改訂版, カルボプラチン2022年9月改訂版)