

登録日 2023/5/30

登録番号 Nsci047

腫瘍名 非小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PTX+Nivolumab			21日毎 × 3コース		
			1コース	2コース	
			1	22 (day)	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	オブジーボ 生理食塩水	360 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
④	デキサート パロノセトロン ファモチジン ポララミン 生理食塩水	19.8 mg 0.75 mg 20 mg 5 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
⑤	パクリタキセル 5%ブドウ糖	175 or 200 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴 180分	↓	↓
⑥	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 5 or 6 250 mL	点滴 60分	↓	↓
⑦	生理食塩水 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓

注意事項

【適応】非小細胞肺がんの術前化学療法(扁平上皮癌または非扁平上皮癌)(EGFR変異又はALK陽性の患者は除く)  
 【投与延期、中止基準】適正使用ガイド参照  
 【調製上及び使用上の注意】  
 ・オブジーボ、パクリタキセルはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μ m)  
 ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。  
 ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。  
 ・CBDCA量(mg)=AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。

参考文献

1) N Engl J Med, 386, 1973-1985 (2022).  
 2) 各添付文書  
 (オブジーボ2023年3月改訂版, パクリタキセル2020年4月改訂版, カルボプラチン2022年9月改訂版)