

登録日 2023/12/26

レジメン名 BRE036

腫瘍名 乳がん


申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

フェスゴ療法


21日毎 × PDまで
(術前・術後療法の場合、最大18コースまで)

初回投与(初回用量)



① フェスゴ配合皮下注IN 15 mL 皮下注 8分以上
(大腿部)

2回目以降(維持用量)



② フェスゴ配合皮下注MA 10 mL 皮下注 5分以上
(大腿部)

注意事項

【適応】

・HER2陽性の乳癌

院内運用として、術後・手術不能または再発乳癌に対して、本剤を単独で使用する場合に用いる。

院内登録されたパージェタ+トラスツズマブ+化学療法の治療歴があれば使用可能。

・術前・術後療法の場合、投与期間は12ヵ月までとする(添付文書)

術前及び術後で既存のパージェタ+トラスツズマブ使用した場合、

ベルツズマブとトラスツズマブの投与は合計1年間(最大18コース)までとする。

【使用上の注意】

・大腿部に皮下投与すること(同一箇所へ繰り返し投与は避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと)

・25～26Gの針を使用

・心機能を確認する(適正使用ガイド参照)。

当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。

【投与延期してから再開する際の用量】

・前回投与日から6週間以上の時は、改めて初回投与量を投与する。

参考文献

1) Lancet Oncol, 22, 85-97 (2021).

2) フェスゴ®配合皮下注添付文書2023年11月改訂版