

登録日 2024/2/27

レジメン名 Nscl049

腫瘍名 非小細胞肺癌

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

				21日毎 × PDまで				
				1コース	8	15	2コース	...
				1			22	(Day)
①	デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓			↓	
	パロノセトロン	0.75 mg						
	生理食塩水	50 mL						
②	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴 5分	↓			↓	
	(フラッシュ用)							
③	エンハーツ	5.4 mg/kg	点滴 30分	↓			↓	
	注射用水	20 mL						
	5%ブドウ糖液	100 mL						
				初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能				
④	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴 5分	↓			↓	
	(フラッシュ用)							

注意事項

【使用上の注意】
・がん化学療法後に増悪したHER2遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌（オンコマインDxまたはGuardant360 CDx がん遺伝子パネルが承認された体外診断用医薬品）
・初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
・心機能を確認する（適正使用ガイド参照）。
当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。
・投与の際には、胸部X線及び胸部CT検査、SpO2検査、KL-6測定を行い、適宜フォローする。
・0.2 μ mインラインフィルターを使用する。
・血管外漏出リスク：炎症性
・投与中および最終投与後一定期間は適切な避妊を行うこと
一定期間は、女性7ヵ月、男性4ヵ月が目安（適正使用ガイド引用）
・制吐剤として、Day1～3にアプレピタントを使用する（NCCNガイドラインの高度催吐リスクに準ずる）。
【減量・中止基準】
・適正使用ガイド、添付文書を参照。

参考文献

1) J Clin Oncol, 41, 4852-4863 (2023).
2) エンハーツ添付文書
3) エンハーツ適正使用ガイド