

登録日 2025/1/22

レジメン名 BRE038

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

Sacituzumab-Govitecan

21日毎 × PDまで



① デキサート	9.9 mg	点滴 15分
パロノセトロン	0.75 mg	
ポララミン	5 mg	
ファモチジン	20 mg	
生理食塩水	50 mL	



② 生理食塩水	50 mL	点滴 5分
(フラッシュ用)		



③ トロデルビ	10 mg/kg	点滴 180分
生理食塩水	250 mL	



初回180分、副作用なければ2回目120分、3回目以降60分に短縮可

投与量が850mgを超える時、溶媒を500mLとする。

投与量が275mg未満の時、溶媒を100mLとする。

④ 生理食塩水	50 mL	点滴 5分
(フラッシュ用)		



注意事項

【適応】

- ・化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌
- ・タキサン系抗悪性腫瘍剤の治療歴があること

【使用上の注意】

- ・アプレピタント内服を投与(Day1:125mg, Day2～3:80mg)、Day2～3までデカドロン4mg/dayを投与
- ・投与終了後30分は、院内で観察を行う。

【減量・中止基準】

- ・適正使用ガイドを参照。

【減量の目安】

- ・1段階減量: 7.5mg/kg、2段階減量: 5mg/kg、3段階減量: 投与中止

1)N Engl J Med, 384, 1529–1541 (2021).

2)トロデルビ添付文書2024年9月