

登録日 2024/7/10

登録番号 Nscl050

腫瘍名 非小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PEM+Osimertinib				21日毎 × 4コース	
				1コース	2コース
				1 8 15	22 ... (day)
①	デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓	↓
	パロノセトロン	0.75 mg			
	生理食塩水	50 mL			
②	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴 10分	↓	↓
	生理食塩水	100 mL			
③	カルボプラチン	AUC 5	点滴 60分	↓	↓
	5%ブドウ糖	250 mL			
④	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓
	(カルボプラチン用フラッシュ)		(全開)		
⑤	タグリッソ	80 mg/day	内服 1日1回	Day1~21	
5コース目から、PEM+OsimertinibのみPDまで継続					
				5コース	6コース
				1 8 15	22 ... (day)
①	デキサート	6.6 mg	点滴 15分	↓	↓
	生理食塩水	50 mL			
②	ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴 10分	↓	↓
	生理食塩水	100 mL			
③	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓
	(ペメトレキセド用フラッシュ)		(全開)		
④	タグリッソ	80 mg/day	内服 1日1回	Day1~21	

注意事項

- ・適応: 非扁平上皮癌
[注釈: 臨床試験基準ではEGFR変異陽性(exon19delまたはL858R)を対象とした]
- ・ペメトレキセド開始7日以上前から葉酸0.5mgを連日経口投与する。レジメンを中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ・少なくともペメトレキセド開始7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。
- ・治療期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
- ・心機能を確認する(タグリッソ適正使用ガイド参照)。
当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。

参考文献

- 1) N Engl J Med, 389, 1935-1948 (2023).
- 2) 各薬剤添付文書(タグリッソ 2024年6月改訂版、ペメトレキセド 2024年1月改訂版、カルボプラチン 2024年7月改訂版)