

登録日 2025/6/5

登録番号 Cer025

腫瘍名 子宮頸がん

申請医師 産婦人科

投与スケジュール

Tisotumab Vedotin			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓
③	テブダック 注射用水 生理食塩水	2 mg/kg 20 mL 100 mL	点滴 30分	↓
37kg以下の場合、溶解液の生食を50mLに変更する				
④	生理食塩水 (テブダック用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓

注意事項

・化学療法歴のある進行、再発の子宮頸癌（原則、2次治療以降に使用）

【調製上及び使用上の注意】

- ・インラインフィルターを使用（0.2 μm）。
- ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・テブダックの希釈後の最終濃度は0.7～2.4mg/mLとする。
- ・本剤投与開始前（1コース目開始前）に眼科医による診察をすること。
- ・**アイケアを実施**
(投与前の目の確認、指定の点眼薬を使用、投与中の目の冷却、治療期間中のコンタクトレンズ装着禁止)

投与中の目の冷却は、本剤投与5分前から、投与中、投与30分後まで実施する。

・点眼薬の処方内容

- ①フルメロン点眼液0.1% テブダック投与前日から投与の2日後まで(4日間) 1日4回
- ②アイファガン点眼液0.1% テブダック投与直前に1回点眼(1～3滴)
- ③ヒアレイン点眼液0.1% 1日4回 テブダック投与日～投与終了後30日まで

【減量基準】

- ・添付文書、適正使用ガイド参照

参考文献

1) テブダック 添付文書 2025年3月作成版
2) N Engl J Med, 391, 44-55 (2024).