

登録日	2025/4/22
腫瘍名	子宮肉腫

登録番号	End017(限定)
申請診療科	産婦人科

投与スケジュール

ADM+Trabectedin				21日毎×6コース	
				1コース	2コース
				1 2	22 ... (day)
① デキサート	19.8 mg	点滴	30分	↓	↓
パロノセトロン	0.75 mg				
生理食塩水	50 mL				
② ドキソルビン	60 mg/m ²	点滴	5分	↓	↓
5%ブドウ糖液	100 mL	(全開)			
5%ブドウ糖液50mLを抜いて、ドキソルビンを混合する。					
③ 生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
(ドキソルビン用フラッシュ)					
④ ヨンデリス	1.1 mg/m ²	点滴	3時間	↓	↓
生理食塩水	500 mL				
⑤ 生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
(ヨンデリス用フラッシュ)					
⑥ ペグフィルグラスチムBS	3.6 mg	皮下注		↓	
Trabectedin維持療法				21日毎×17コースまたはPDまで	
				1コース	2コース
				1	22 ... (day)
① デキサート	19.8 mg	点滴	30分	↓	↓
パロノセトロン	0.75 mg				
生理食塩水	50 mL				
② 生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
(前投薬用フラッシュ)					
③ ヨンデリス	1.1 mg/m ²	点滴	3時間	↓	↓
生理食塩水	500 mL				
④ 生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
(ヨンデリス用フラッシュ)					

注意事項

【適応】子宮肉腫
【調製上及び使用上の注意】
・悪心対策では、デカドロン 8mg Day2、3に投与検討 (ヨンデリスの相互作用からアプレピタント使用不可)
・ドキソルビン
累積投与量は500mg/m ² 以下とする
心機能を確認(当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする)
ドキソルビンは、5%ブドウ糖液100mLから50mLを抜いて、ドキソルビン液を混合する。
・ヨンデリス
中心静脈ルートから投与(漏出時に重度の組織障害を起こすため):末梢投与禁止。
横紋筋融解症が報告されており、CPKの検査を行い、筋肉痛、手足のしびれ、脱力感、赤褐色尿等の症状を観察する。
【減量目安】
・ドキソルビン 開始量:60mg/m ² → 1段階減量:50mg/m ² 、2段階減量:45mg/m ²
・ヨンデリス 通常:1.1mg/m ² → 1段階減量:0.9mg/m ² 、2段階減量:0.7mg/m ²

参考文献

1) N Engl J Med. 391, 789-799 (2024).
2) 添付文書(ドキソルビン2023年7月改訂版、ヨンデリス2024年改訂版)