

登録日	2025/6/24
腫瘍名	悪性中皮腫

登録番号	Meso006
申請医師	呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PEM+Pembrolizumab

21日毎 × 6コース
(7コース目から、キイトルーダのみPDまで継続)

①	薬剤	用量	投与方法	時間	1コース	2コース
①	デキサート	9.9 mg	点滴	15分	↓	↓
	パロノセトロン	0.75 mg			↓	↓
	生理食塩水	50 mL			↓	↓
②	生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
	(前投薬用フラッシュ)		(全開)		↓	↓
③	キイトルーダ	200 mg	点滴	30分	↓	↓
	生理食塩水	100 mL			↓	↓
④	生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
	(キイトルーダ用フラッシュ)		(全開)		↓	↓
⑤	ペムレキセド	500 mg/m ²	点滴	10分	↓	↓
	生理食塩水	100 mL			↓	↓
⑥	カルボプラチン	AUC 5	点滴	60分	↓	↓
	5%ブドウ糖	250 mL			↓	↓
⑦	生理食塩水	50 mL	点滴	5分	↓	↓
	(カルボプラチン用フラッシュ)		(全開)		↓	↓

7コース目から、PembrolizumabのみPDまで継続。維持療法レジメンを参照。

注意事項

- ・適応：化学療法歴のない切除不能な進行再発の悪性胸膜中皮腫
- ・キイトルーダはインラインフィルターを使用する。
- ・本治療開始7日以上前から葉酸0.5mgを連日経口投与する。レジメンを中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ・少なくとも本治療開始7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。
- ・治療期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。

参考文献

- 1) Lancet., 402, 2295-2306 (2023).
- 2) 添付文書(キイトルーダ2025年5月改訂版、ペムレキセド2025年1月改訂版、カルボプラチン2025年5月改訂版)