

登録日	2025/9/19
腫瘍名	大腸がん

登録番号	Col045
申請医師	消化器内科

投与スケジュール

Nivolumab+Ipilimumab			21日毎 × 4コース	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
② オプジーボ 生理食塩水	240 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③ 生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 30分	↓	↓
④ ヤーボイ 生理食塩水	1 mg/kg 20 mL	点滴 30分	↓	↓
⑤ 生理食塩水 (ヤーボイ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓

Nivolumab維持療法時			28日毎 × PDまで	
			5コース	6コース
			1	29 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
② オプジーボ 生理食塩水	480 mg 76 mL	点滴 30分	↓	↓
③ 生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓

注意事項

【適応】

・MSI-Highを有する結腸癌・直腸癌

【投与延期、中止基準】

・適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

- ・本治療は4コース実施後、Nivolumab単剤治療（維持療法）へ移行する。
- ・オプジーボはインラインフィルターを使用（**0.2または0.22 μ m**）
- ・オプジーボはCVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・ヤーボイはインラインフィルターを使用（**0.2～1.2 μ m**）
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1～4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) New Engl J Med, 391, 2014–2026 (2024).
- 2) Lancet, 405, 383–395 (2025).
- 3) 各添付文書（オプジーボ2025年6月改訂版、ヤーボイ2025年8月改訂版）